

## 「曼普歐西比」農藥使用方法及其範圍

中華民國 114 年 4 月 10 日農授防字第 1141875597E 號公告修正

280 g/L (28% w/v) 曼普歐西比 水懸劑 (SC)

| 作物<br>名稱                | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項 | 說明 |
|-------------------------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|----|
| 十字花<br>科包葉<br>菜類        | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7-10            | 共 2<br>次 |          | 7                |      |    |
| 十字花<br>科小葉<br>菜類        | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 不結球<br>萵苣與<br>半結球<br>萵苣 | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 茼蒿                      | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 山茼蒿                     | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 紅鳳菜                     | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 白鳳菜                     | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 芳香萬<br>壽菊               | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 闊包菊                     | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 蒜                       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |
| 蔥                       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施       | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項 | 說明                  |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|---------------------|
|          |          |                 |          | 藥。                  |                 |          |          |                  |      |                     |
| 韭        | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 落蓴       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 珠蔥       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 龍鬚菜      | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 羅勒       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 菠菜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 3                |      |                     |
| 蘿蔔       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 14               |      |                     |
| 蕪菁       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 14               |      |                     |
| 山葵       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 14               |      |                     |
| 胡瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |                     |
| 胡瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      | 重複 範<br>圍，本項<br>刪除。 |
| 苦瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |                     |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項 | 說明 |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|----|
| 絲瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 冬瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 南瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 扁蒲       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 隼人瓜      | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 越瓜       | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 夏南瓜      | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 木鼈果      | 露菌病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | 2                |      |    |
| 木瓜       | 果疫病      | 0.4 公<br>升      | 5,000    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 14               |      |    |
| 葡萄       | 露菌病      | 0.67 公<br>升     | 1,800    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7-10            | 共 2<br>次 |          | 21               |      |    |
| 蓮霧       | 疫病       | 0.4 公<br>升      | 5,000    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 14               |      |    |
| 番石榴      | 疫病       | 0.4 公<br>升      | 5,000    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 3<br>次 |          | 14               |      |    |
| 無花果      | 疫病       | 0.4 公           | 5,000    | 病害發生初               | 7               | 共 3      |          | 14               |      |    |

| 作物<br>名稱 | 病蟲<br>名稱 | 每公頃<br>每次用<br>量 | 稀釋<br>倍數 | 使用時期                | 施藥<br>間隔<br>(天) | 施藥<br>次數 | 施藥<br>方法 | 安全<br>採收<br>期(天) | 注意事項 | 說明                                                     |
|----------|----------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|----------|----------|------------------|------|--------------------------------------------------------|
|          |          | 升               |          | 期開始施<br>藥。          |                 | 次        |          |                  |      |                                                        |
| 番茄       | 晚疫病      | 0.4 公<br>升      | 2,500    | 病害發生初<br>期開始施<br>藥。 | 7               | 共 2<br>次 |          | <u>3</u>         |      | 本項新<br>增。原<br>始登記<br>廠商名<br>稱：台<br>灣先正<br>達股份<br>有限公司。 |